ПРИКЛАДНАЯ ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

20XX Название раздела журнала №X(X)

УДК 511.9

arXiv:1302.4062v3 [cs.DM] 20 Apr 2013

ОЦЕНКА МОЩНОСТИ МНОЖЕСТВА, СОДЕРЖАЩЕГО КРАТЧАЙШИЙ ВЕКТОР, ОБРАЗОВАННОГО БАЗИСОМ РЕШЕТКИ ПРИВЕДЕННОЙ БЛОЧНЫМ МЕТОДОМ КОРКИНА-ЗОЛОТАРЕВА

В. С. Усатюк

E-mail: L@Lcrypto.com

В работе получена верхняя оценка мощности множества, содержащего кратчайший вектор, образованного базисом решетки приведенной блочным методом Коркина-Золотарева. Показано влияние плотности решеток на рост мощности этого множества. Получены мощности множеств, содержащих кратчайший вектор, образованных базисами критических решеток, а так же решеток Гольштейна-Майера приведенных блочным методом Коркина-Золотарева.

Ключевые слова: *поиск кратчайшего вектора, мощность пространства перебора, блочный метод Коркина-Золотарева, критические решетки, решетки Гольдштейна-Майера.*

В работе [1], Коркиным и Золотаревым был предложен метод приведения положительной квадратичной формы (ПКФ) от m-переменных. На основе перехода от ПКФ к точечным решеткам и «ослабления» метода, был построен первый полиномиальный по временной сложности алгоритм приведения базиса решеток, известный как LLL-алгоритм. В работе [2] был использован оригинальный метод Коркина-Золотарева, на основе перехода от ПКФ к точечным решеткам, был получен метод приведения решеток по Коркину-Золотареву. В работе [3] был предложен метод приведения базиса, получивший название - "блочный метод Коркина-Золотарева"(BKZ, Block Korkin-Zolotarev method), в зависимости от вариации параметров (δ, β), образующий иерархию методов приведения решеток от LLL-алгоритма ($\beta = 2$) до приведения по Коркину-Золотареву (блока состоящего из всех векторов базиса решетки, $\beta = m$). Оценим мощность пространства перебора для решения задачи поиска кратчайшего вектора решетки, заданного базисом, предварительно приведенным BKZ-методом.

Теорема 1. Пусть $b_1, b_2, ..., b_m$- базис полной решетки $L \subseteq R^m$, который приведен BKZ-методом с размером блока β, λ_i- i-й соответствующий минимум решетки, γ_β- константа Эрмита, $[\cdot]$-округление до целого значения. Нижняя оценка мощности множества содержащего кратчайший вектор решетки L равна:

$$\prod_{j=1}^{m}\left(1+2\left[\gamma_{\beta}^{\frac{j-m}{\beta-1}}\frac{\lambda_1\left(L\right)}{\lambda_j\left(L\right)}\right]\right).$$

Доказательство. Рассмотрим случай полной решетки. Возьмем произвольный вектор $x \in L$, по определению решетки он представим в виде $x = \sum_{i=1}^{m} y_i b_i, y_i \in Z$.

Пусть $j \leqslant m$- наибольшее такое, что $y_j \neq 0$. Тогда рассмотрим модуль скалярного произведения $\sum_{i=1}^{m} y_i b_i$ на $b_j^{\perp}$, где $b_j^{\perp}$-ортогональный вектор полученный в результате применения QR-разложения, например методом ортогонализации Грама-Шмидта.

Поскольку скалярное произведение ортогональных векторов будут давать 0, ортогональное преобразование сохраняет скалярное произведение векторов $\left\langle b_j, b_j^{\perp}\right\rangle = \left\langle b_j^{\perp}, b_j^{\perp}\right\rangle)$ получаем:

$$\left|\left\langle \sum_{i=1}^{j} y_i b_i, b_j^{\perp} \right\rangle\right| = |y_j| \left\langle b_j^{\perp}, b_j^{\perp} \right\rangle = |y_j| \left\|b_j^{\perp}\right\|^2. \tag{1}$$

С другой стороны применим неравенство Коши-Буняковского получим:

$$\left|\left\langle \sum_{i=1}^{m} y_i b_i, b_j^{\perp} \right\rangle\right| \leqslant \left\|\sum_{i=1}^{m} y_i b_i\right\| \cdot \left\|b_j^{\perp}\right\|. \tag{2}$$

Подставив соотношение (1) в неравенство (2), получим $\|x\| = \|\sum_{i=1}^{m} y_i b_i\| \geqslant \frac{\left||y_j|\left\|b_j^{\perp}\right\|^2\right|}{\left\|b_j^{\perp}\right\|} \geqslant |y_j| \left\|b_j^{\perp}\right\|$. Последнее неравенство устанавливает нижнюю оценку длины кратчайшего вектора в решетке $\|x\| \geqslant |y_j| \left\|b_j^{\perp}\right\|, y_j \in Z\backslash\{0\}$.

Аналогичным образом рассмотрим случай y_{j-1}.

$$\left|\left\langle \sum_{i=1}^{j} y_i b_i, b_{j-1}^{\perp} \right\rangle\right| = \left||y_{j-1}| \left\langle b_{j-1}^{\perp}, b_{j-1}^{\perp} \right\rangle + \sum_{i=j}^{m} \left\langle y_i b_i, b_{j-1}^{\perp} \right\rangle\right| = \left||y_{j-1}| \left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|^2 + \sum_{i=j}^{m} \left\langle y_i b_i, b_{j-1}^{\perp} \right\rangle\right|. \tag{3}$$

С другой стороны применим неравенство Коши-Буняковского получим:

$$\left|\left\langle \sum_{i=1}^{m} y_i b_i, b_{j-1}^{\perp} \right\rangle\right| \leqslant \left\|\sum_{i=1}^{m} y_i b_i\right\| \cdot \left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|. \tag{4}$$

Подставив соотношение (3) в неравенство (4), получим:

$$\|x\| = \left\|\sum_{i=1}^{m} y_i b_i\right\| \geqslant \frac{\left||y_{j-1}| \left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|^2 + \sum_{i=j}^{m} \left\langle y_i b_i, b_{j-1}^{\perp} \right\rangle\right|}{\left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|}$$

$$\frac{\|x\|}{\left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|} \geqslant \left||y_{j-1}| + \frac{\sum_{i=j}^{m} \left\langle y_i b_i, b_{j-1}^{\perp} \right\rangle}{\left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|^2}\right|$$

$$\frac{\|x\|}{\left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|} \geqslant \left||y_{j-1}| + \sum_{i=j}^{m} y_i \mu_{i,j}\right|,$$

где $\mu_{i,j} = \frac{\left\langle b_i, b_j^{\perp} \right\rangle}{\left\langle b_j^{\perp}, b_j^{\perp} \right\rangle} = \frac{\left\langle b_i, b_j^{\perp} \right\rangle}{\left\|b_j^{\perp}\right\|^2}, 1 \leqslant j < i \leqslant m$ -коэффициенты Грама-Шмидта.

Тогда $|y_{j-1}| \in Z$ принимает целые значения на отрезке:

$$\sum_{i=j}^{m} y_i \mu_{i,j} - \frac{\|x\|}{\left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|} \leqslant |y_{j-1}| \leqslant \sum_{i=j}^{m} y_i \mu_{i,j} + \frac{\|x\|}{\left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|}.$$

Таким образом, в худшем случае, когда $\sum_{i=j}^{m} y_i \mu_{i,j} - \frac{\|x\|}{\left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|} \geqslant 0$, y_{j-1} принимает $\frac{\|x\|}{\left\|b_{j-1}^{\perp}\right\|}$ целых значений от точки центра с координатами $\sum_{i=j}^{m} y_i \mu_{i,j}$.

Рассмотрим произвольный целочисленный вектор $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$, умножение которого на векторы базиса решетки L, даст нам всевозможные векторы, принадлежащие этой решетке, $x = \sum_{i=1}^{m} y_i b_i, y_i \in Z$. Рассматривая координатные компоненты от m до 1 получим $\left(1 + 2\left[\frac{\|x\|}{\|b_m^{\perp}\|}\right]\right) \cdot \left(1 + 2\left[\frac{\|x\|}{\|b_{m-1}^{\perp}\|}\right]\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 + 2\left[\frac{\|x\|}{\|b_1^{\perp}\|}\right]\right) = \prod_{j=1}^{m}\left(1 + 2\left[\frac{\|x\|}{\|b_j^{\perp}\|}\right]\right)$ вариантов для вектора y.

Так как базис фиксирован $B = \{b_1, b_2, ..., b_m\}$, то число возможных вариантов значений принимаемых векторами решетки $x = \sum_{i=1}^{m} y_i b_i, y_i \in Z$ определятся мощностью целых векторов y и равно

$$\prod_{j=1}^{m}\left(1 + 2\left[\frac{\|x\|}{\|b_j^{\perp}\|}\right]\right). \tag{5}$$

В базисе приведенном BKZ-методом первый вектор кратчайший в блоке приведенного базиса $\|x\| \leqslant \|b_1\|$, подставив соотношение в неравенство 3 получим:

$$\prod_{j=1}^{m}\left(1 + 2\frac{\|x\|}{\|b_j^{\perp}\|}\right) \leqslant \prod_{j=1}^{m}\left(1 + 2\left[\frac{\|b_1\|}{\|b_j^{\perp}\|}\right]\right). \tag{6}$$

Из тривиальных соображений:

$$\|b_1\| \geqslant \lambda_1(L). \tag{7}$$

В работе [4] доказано, что в результате применения блочного метода Коркина-Золотарева для решетки $L \in R^n$ ранга m, с размером блока β, будет получен базис, $B = \{b_1, b_2, ..., b_m\}$ для которого выполняются следующие неравенства $(i = 1, ..., m)$:

$$\left\|b_i^{\perp}\right\|^2 \leqslant \gamma_{\beta}^{2\frac{m-i}{\beta-1}} \cdot \lambda_i(L)^2. \tag{8}$$

Подставив в неравенство (6), выражения (7) и (8), получим искомую оценку

$$\prod_{j=1}^{m}\left(1 + 2\left[\gamma_{\beta}^{\frac{j-m}{\beta-1}}\frac{\lambda_1(L)}{\lambda_j(L)}\right]\right)$$

Теорема 2. Пусть $b_1, b_2, ..., b_m$- базис полной критической решетки или решетки Гольштейна-Майера $L \subseteq R^m$, который приведен BKZ-методом с размером блока β, γ_{β}- константа Эрмита, $[\cdot]$-округление до целого значения. Нижняя оценка мощности множества содержащего кратчайший вектор решетки L равна:

$$\prod_{j=1}^{m}\left(1 + 2\left[\gamma_{\beta}^{\frac{j-m}{\beta-1}}\right]\right).$$

Доказательство. Из теоремы 1 следует, что мощность пространства перебора для нахождения кратчайшего вектора, уменьшается при $\lambda_1(L) < \lambda_j(L)$, так как, в этом случае $\frac{\lambda_1(L)}{\lambda_j(L)} < 1$. Для критических решеток [5], а так же «близких» к ним, решеток сложных по Гольштейну-Майеру [6], выполняется $\frac{\lambda_1(L)}{\lambda_j(L)} = 1$ и $\frac{\lambda_1(L)}{\lambda_j(L)} \approx 1$ соответственно. Из теоремы 1 получим мощность множества $\prod_{j=1}^{m}\left(1 + 2\left[\gamma_{\beta}^{\frac{j-1}{\beta-1}}\right]\right)$ векторов.

Продемонстрируем преимущество полученной оценки. При размере блока $\beta = 2$, BKZ-метод переходит в LLL-алгоритм(Ленстра-Ленстра-Ловаса), при $\delta = 1$. Однако, в этом случае LLL-алгоритм не всегда выполняется за полиномиальное время, а значит, утрачивает свое основное преимущество. Рассмотрим классический вариант LLL-алгоритма, в котором $\delta = \frac{3}{4}$ [7]. Для него выполняется: $b_1 = b_1^{\perp}$, $\|b_1\| \leqslant \sqrt{2}^{i-1}\left\|b_i^{\perp}\right\|, i = 2...m$. Из доказательства теоремы 1 получим $\prod_{i=1}^{m}\left(1+2\left[\frac{\|b_1\|}{\left\|b_i^{\perp}\right\|}\right]\right) \leqslant 3\cdot\prod_{i=2}^{m}\left(1+2\cdot\left[\sqrt{2}^{i-1}\right]\right)$, что лучше $(2\cdot 2^{\frac{m(m-1)}{4}}+1)^m$, оценки приведенной в работе (см. [8], с. 370-371).

При $\beta = m$, BKZ-метод переходит в приведение базиса по Коркину-Золотареву, [2]. Из доказательства теоремы 1 и оценок $\left\|b_i^{\perp}\right\| \geqslant \lambda_1(L)\cdot i^{-(1+\log i)}$ (см. [2]), $\|b_1\| \leqslant \gamma_m\cdot\lambda_1(L)$ (см. [4]), получим верхнюю оценку мощности множества содержащего кратчайший вектор равную $\prod_{j=1}^{m}\left(1+2\left[\gamma_m\cdot j^{1+\log j}\right]\right) = \prod_{j=1}^{m}\left(1+2\left[\gamma_m\cdot j^{1+\log j}\right]\right)$. Из теоремы 1, получим нижнюю оценку мощности множества содержащего кратчайший вектор:

$$\prod_{j=1}^{m}\left(1+2\left[\gamma_m^{\frac{j-m}{m-1}}\frac{\lambda_1(L)}{\lambda_j(L)}\right]\right).$$

Доказанная обобщенная оценка, уточняет полученные раннее, а также демонстрирует влияние плотности решетки на рост мощности пространства перебора при решении задачи поиска кратчайшего вектора в случае предварительного приведения ее базиса блочным методом Коркина-Золотарева. Может применяться для случайных решеток, если удается вычислить отношения ее соответствующих минимумов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Korkine A., Zolotareff G.* Sur les formes quadratuques // Math. Ann.. 1873. №6. pp. 366–389.
2. *Lagarias J. C., Lenstra H. W. JR., Schnorr C. P.* Korkin-Zolotarev bases and successive minima of a lattice and its reciprocal lattice //Combinatorica. 1990. V.10. №4. pp. 333–348.
3. *Schnorr C. P., Euchner M.* Lattice Basis Reduction: Improved Practical Algorithms and Solving Subset Sum Problems // LNCS. 1991. V. 591. pp. 68–85.
4. *Schnorr C. P.* Block reduced lattice bases and successive minima // Combinatorics, Probability and Computing. 1994. V. 3. pp. 507–522.
5. *Малышев А. В.* Основные понятия и теоремы геометрии чисел // Труды Петрозав. Гос. ун-та. Серия «Математика». 1992. №4. с. 2–42.
6. *Goldstein D., Mayer A.* On the equidistribution of Hecke points // Forum Mathematicum. 2003. V. 15. №2. pp. 165–189.
7. *Lenstra A., Lenstra H., Lovasz L.* Factoring polynomials with rational coefficients // Math. Ann.. 1982. V. 261. №4. pp. 515–534.
8. *Глухов М. М.,Круглов И. А.,Пичкур А. Б.,Черемушкин А. В.* Введение в теоретико-числовые методы криптографии: Учебное пособие. СПб.: «Лань», 2011. 400 с.
9. *Schnorr C. P.* A hierarchy of polynomial-time lattice basis reduction algorithms // Theoretical Computer Science. 1987. V. 53. pp. 201–224.

Usatyuk V. S. **LOWER BOUND ON THE CARDINALITY CONTAINING SHORTEST VECTORS IN A LATTICE REDUCED BY BLOCK KORKIN-ZOLOTAREV METHOD.** This article present a concise estimate of upper bound on the cardinality containing shortest vector in a lattice reduced by block Korkin-Zolotarev method (BKZ) for different value of the block size. Paper show how density affect to this cardinality, in form of the ratio of shortest vector size and successive minimal. Moreover

we give upper estimate of cardinality for critical and Goldstein-Mayer lattices.

Keywords: *cardinality estimate, shortest vector problem, SVP, block Korkin-Zolotarev, BKZ, HKZ, critical and Goldshtein-Mayer lattices.*